

## De aandoening

### SI-gewricht

Het SI (sacro-illiaal) gewricht is het gewricht tussen het heiligbeen (sacrum) en de bekkenrand (ilium).


Het gewricht bevindt zich dus links en rechts van het heiligbeen.

### Klachten

Een SI dysfunctie kan pijn veroorzaken in het SI gebied, maar ook in de lies, hamstrings en onderrug.

### SI-overbelasting

Het SI gewricht laat zeer weinig beweging toe (slechts enkele mm's). De kleine beweging is echter zeer belangrijk voor het doorgeven van de krachten van de benen naar de romp en omgekeerd. Bij rugproblemen of bij zwakke rug- en buikspieren treedt er (vooral bij het hardlopen) een iets veranderd loop/belastingspatroon op waarbij de beenspieren (quadriceps en hamstrings) een deel van de rug/buikspier functie proberen over te nemen door het bekken te stabiliseren, hierdoor wordt de beweging in de SI-gewrichten verminderd, aangezien de bewegingsmogelijkheid sowieso weinig uitgesproken is, gaat SI gewricht snel vastzitten. In dat geval spreekt men van een SI-blokkade. Het mobiliseren en soepel houden van het SI gewricht lost vaak een belangrijk deel van de geassocieerde lies/hamstring/rugklachten op. Het mobiliseren van het SI-gewricht kan op 2 manieren: het kan worden gedaan door een manueel geneeskundige fysiotherapeut/arts ("kraken") of door het veelvuldig uitvoeren van oefeningen. Voer de onderstaande oefeningen 2x/dag uit.



### Manueel geneeskundige behandeling

De arts kan beoordelen of uw SI gewricht geblokkeerd is (een asymmetrie in beweging tussen het linker en rechter SI gewricht). Vervolgens kan hij de bewegingsmogelijkheid van het SI gewricht proberen te vergroten met rekkings- en tractie mobilisaties. De arts kan u hiervoor ook verwijzen naar een manueeltherapeut (vorm van fysiotherapie).

### Oefening 1: molenwieken

Staande houding met de benen gespreid ( $\pm 1$  meter). Buk voorover en raak met de rechter hand linker voet (indien dit niet lukt: probeer zo veel mogelijk in de buurt te komen). Kom vervolgens weer helemaal overeind (dus niet voorover gebogen blijven staan en enkel zwaaien met de arm) en buk weer voorover en met de linker hand naar de rechter voet. Blijf de benen constant gestrekt houden. Doe dit voor elke zijde (dus 30 totaal). Herhaal deze oefening 3 keer met tussenpozen van 1 minuut (3x30).



aan  
ga nu  
15x

### Oefening 2: SI-rekken


Ga op de rug liggen. Trek vervolgens de rechter knie op. Pak de met linker hand en duw de rechter knie met de linker hand naar zo naar links. De rek moet in het SI gewricht ontstaan en daarom is de schouders op de ondergrond te houden en rechter arm naar rechts op de ondergrond te houden. Hou de positie 30 vast en doe dit 3x beiderzijds.



rechter knie  
ver mogelijk  
belangrijk  
uitgestrekt  
seconden

### Oefening 3: roteren

Ga staan met de benen licht gespreid ( $\pm \frac{1}{2}$  meter). Draai vervolgens het boven lichaam naar rechts. Probeer het bekken niet mee te laten draaien, zodat de rotatie beweging enkel uit de rug komt. In eindstand van de rotatie moet worden doorgeveerd, door met de armen mee te zwaaien gaat dit makkelijker. Veer 2x na en draai vervolgens naar de andere zijde. Doe dit voor elke zijde 15x (dus 30 totaal). Herhaal deze oefening 3 keer met tussenpozen van 1 minuut (3x30).



met

### Oefening 4: krachtoefening

Ga op de rug liggen met de handen langs zij. Probeer nu het rechterbeen richting de rechter schouder te trekken terwijl het rechter been gestrekt op de ondergrond blijft liggen. Probeer tegelijkertijd en linker been in de tegengestelde richting te bewegen. Dit is een krachtoefening van de bilspieren en de schuine buikspieren. Doe dit voor elke zijde 15x (dus 30 totaal). Herhaal deze oefening 3 keer met tussenpozen van 1 minuut (3x30).



### Sport

Meestal is er een al een flinke vooruitgang met de oefeningen na 2 weken. Stoppen met loopsport gedurende 2

weken is dus meestal voldoende, daarna kan het loopprogramma weer langzaam worden opgebouwd op geleide van de klachten. In de tussentijd kan bv met fietsen de kracht op peil worden gehouden.

## **Duur**

Na 4 weken moeten de klachten verminderd zijn, indien dit niet het geval is: contacteer de sportarts.

## **Ontstekingswerende medicatie/injectie**

Aangezien de SI-blokkade een functioneel probleem is, hebben medicijnen en injecties weinig of geen effect. Ontstekingswerende middelen worden enkel gebruikt bij hevige pijn.

## **Preventie**

- Het onderhouden van bovenstaande oefeningen is al een zeer effectieve maatregel.
- Kracht- en mobiliserende oefeningen van de rug (vraag de sportarts hierna) werken ook effectief, omdat een groot gedeelte van de SI-problematiek secundair is aan rugproblemen.
- Beenlengte verschil corrigeren
- niet aan 1 kant van de weg lopen
- lopen op een zachte ondergrond
- rekkingsoefeningen + bovenstaande oefeningen 1+3 inpassen in warming-up en cooling-down